

## INFORMACIÓN AL VIAJERO.

### VACUNA DE LA HEPATITIS A.

#### **Esquema de vacunación:**

Para una correcta vacunación son precisas dos dosis de la vacuna separadas seis meses (marca Havrix) o entre 6 meses y 4 años (marca Epaxal). También se puede realizar un esquema de vacunación rápido con administración de la segunda dosis a los 15 días, e incluso dos dosis simultáneamente (consulte con su médico).

#### **Inicio de la eficacia:**

Con el esquema convencional la vacuna empieza a ser eficaz de 15 a 30 días después de su administración.

Con el esquema acelerado a los 10 a 20 días.

#### **Efectos secundarios:**

El efecto secundario más frecuente es discreto dolor, picor, enrojecimiento e inflamación en el lugar de la inyección. Ocasionalmente algunas personas tienen dolor de cabeza, debilidad, fiebre y dolor abdominal.

No se han observado reacciones adversas graves.

#### **Tratamiento de los efectos secundarios leves:**

En el caso de tener dolor o molestias en el lugar de la inyección puede tomar un analgésico (paracetamol) y aplicar frío local.

#### **Duración de la eficacia:**

Diez años, a partir de este momento se recomienda una dosis de recuerdo.

**SI TIENE ALGUNA DUDA O QUIERE RECIBIR MÁS INFORMACIÓN  
CONSÚLTENOS.**